



TECHNIQUES D'IMMOBILISATION POUR LES PROCÉDURES ET LES TRAITEMENTS

Cet article est extrait du « Cahier clinique de l'âne » (1ère édition) publié par The Donkey Sanctuary.

Plusieurs techniques sont indiquées pour immobiliser l'âne. La minimisation du stress facilite l'immobilisation en toute sécurité pour toutes les parties concernées :

- Il est conseillé aux propriétaires de mener les deux compagnons ensemble dans la cour, l'écurie ou à l'hôpital vétérinaire, car la séparation des compagnons risque d'accroître le stress.
- Si le patient n'est pas membre d'un couple, il convient de faire venir un autre âne calme à proximité du patient.
- Si l'animal a voyagé pour venir à la clinique, il faut d'abord lui donner à manger et à boire.
- Les deux animaux doivent être attachés avec un licol dans un lieu clos, calme et sécurisé.
- Il est essentiel d'utiliser un licol approprié et ajusté.

Vous pouvez également utiliser des vêtements et un équipement de protection individuelle. N'oubliez pas que les ânes ont parfois tendance à écraser les soigneurs contre les murs et les objets solides. Une immobilisation renforcée sera peut-être nécessaire, selon l'animal et les circonstances.



La technique d'immobilisation par la tête convient à un grand nombre de procédures quand il est impossible d'anticiper la réaction de l'animal. Pour les ânes ou les situations imprévisibles, il est plus sûr de se positionner aux côtés de l'âne au cas où il avancerait avec force.

Immobilisation par la tête :

- Tenez la tête à deux mains.
- Maintenez la tête de l'animal près de votre torse.
- Pointez vos pieds en direction de l'âne.
- Si possible, gardez votre jambe avant en contact avec le torse de l'âne.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts.
- Vérifier que les naseaux de l'âne ne sont pas obstrués.

Si cette technique ne permet pas de pratiquer la procédure requise, envisagez :

- La sédation.
- La distraction avec de la nourriture, pendant la procédure.
- L'élévation de la tête de l'âne afin de réduire les risques de déplacement.
- L'élévation du membre antérieur pour limiter les mouvements.



Élévation du membre antérieur effectuée correctement pour limiter les mouvements pendant les procédures de courte durée.

- Le pincement d'un pli de peau sur le cou.

Attention :

La torsion des oreilles est déconseillée : cette technique est douloureuse et risque de provoquer une réaction de peur.

Il est déconseillé d'attraper l'oreille, notamment de la tordre à la main ou à l'aide d'une corde. Ces manipulations sont non seulement douloureuses et potentiellement dommageables, mais elles peuvent également engendrer une réaction de peur dangereuse par la suite à l'approche de la tête.

Il est également déconseillé de tenir les naseaux avec la main, une corde ou d'autres dispositifs, car cette technique entraîne des réactions très variables chez les ânes.

Déplacement de l'âne « figé »

Les ânes non dressés ou peureux peuvent se figer sur place ou se soustraire à une quelconque pression. Les ânes peuvent être dressés pour être menés sans problème, en utilisant des techniques de renforcement appropriées du comportement souhaité. Cependant, les stratégies suivantes de prise en charge sont parfois utiles :

- Aménagez un environnement accueillant pour l'âne, par exemple en retirant tout ce qui risque de l'effrayer, en éclairant les zones d'ombre, en dégagant les accès et en ouvrant les portes autant que possible, ou en répandant de la paille ou d'autres matériaux de litière.
- Approchez le compagnon du patient et encouragez l'âne à aller vers son compagnon, ou placez le compagnon à côté du patient.
- Utilisez la nourriture pour l'encourager.
- Il est parfois efficace de faire reculer l'âne par l'ouverture d'une porte et dans une barre d'examen.
- Un bandeau sur les yeux peut être indiqué, mais cette technique comporte un risque de panique.
- On peut placer un large filet derrière les membres postérieurs de l'animal pour l'empêcher de reculer et l'inciter à avancer.